

Update Prevention and Treatment Hepatitis B virus infection



รศ พญ ฉันทวีร์ ภูธนกิจ
หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมระยะสั้น สมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2556

Global Hepatitis Program



One in 12 people worldwide is living with either chronic hepatitis B or C. The global disease awareness campaign is the World Hepatitis Alliance

World Hepatitis Day 28th July



Q1: ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาในการติดตามทารกที่คลอดจากมารดา HBs Ag +ve ท่านได้เจาะเลือดเด็ก ที่อายุ 9-18 เดือน เพื่อตรวจ HBs Ag, anti HBs

- A. ไม่จำเป็นต้องเจาะ วัคซีน + HBIG ประสิทธิภาพดีมาก
- B. 1-25 %
- C. 25-50%
- D. 50-75%
- E. 75-100%

Enhanced perinatal HBV case management projects

- Conducted in 5 states in US during 2008-2009
- HBs Ag +ve pregnant women N = 4,214
- Check Anti HBs/ HBs Ag during 6-24 mo. of age

Coverage 64%

- Serology results
 - 93.3% antiHBs +ve, HBs Ag –ve
 - 1.2% HBs Ag +ve
 - 3.2 % anti HBs –ve

Q2: ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาในการติดตามทารกที่คลอดจากมารดา HBs Ag +ve ท่านได้แนะนำให้บิดาเจาะเลือดตรวจตับอักเสบบี และ ฉีดวัคซีน HBV

A. ไม่ทำ เป็นหน้าที่หมอสูติ หมอ Med

B. 1-25 %

C. 25-50%

D. 50-75%

E. 75-100%